

Colistina Permateg

Inyectable / Inhalatorio Potencia antibiótica para Gram (-) multirresistentes

*Injectable / Inhalant
Antibiotic for Gram (-) multiresistant*

**Por su mecanismo de acción
se reduce la posibilidad de resistencia**

*Due to his mechanism of action
reduces the possibility of resistance*

- **INFECCIONES POR ENTEROBACTERIAS**
*(Salmonella, Shigella,
Escherichia Coli, Enterobacter)*
ENTEROBACTERS INFECTIONS
- **INFECCIONES RESPIRATORIAS
POR PSEUDOMONAS
AERUGINOSA (Fibrosis Quísticas)**
**PSEUDOMONAS AERUGINOSA
RESPIRATORY INFECTIONS**
- **INFECCIONES RESPIRATORIAS
POR ACINETOBACTER (spp)**
ACINETOBACTER RESPIRATORY INFECTIONS
- **NEUMONIA POR STENOTROPHOMONA
MALTOPHILIA**
STENOTROPHOMONA MALTOPHILIA NEUMONIE

Colistina Permateg®
Colistina como Metansulfonato
Colistimethate sodium

**Sólida trayectoria. Comprobada eficacia.
Permanente evolución.**

Colistina Permateg

INYECTABLE / INHALATORIO INJECTABLE / INHALANT

Solid path. Verified efficiency. Permanent evolution.

Colistina Permateg®

INYECTABLE / INHALATORIO

INJECTABLE / INHALANT

Antibiótico polipeptídico con actividad bactericida.

Cada frasco-ampolla contiene: Colistina (como metansulfonato de sodio equivalente en "base") 100 mg.

Cada ampolla disolvente contiene: Agua Destilada Estéril 2 ml.

Antibiótico parenteral para el tratamiento de infecciones crónicas o agudas. Los siguientes microorganismos han demostrado ser sensibles, tanto *in vitro* como *in vivo*: **Microorganismos aeróbios Gram negativos:** *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomona aeruginosa*.

Tratamiento por inhalación para infecciones pulmonares producidas por cepas susceptibles de *Pseudomona Aeruginosa* en pacientes con Fibrosis Quística. Actúa sobre la superficie celular, penetrando a través de la misma y desestabilizando la membrana celular bacteriana.

Administración I.M. o I.V.:

Adultos: 5 mg/Kg/día	Niños: 2,5 mg/Kg/día
cada 6, 8 o 12 hs.	

La administración puede ser directa o en infusión continua, y debe ajustarse en individuos con insuficiencia renal.

Administración inhalatoria: para el tratamiento local de infecciones del tracto respiratorio inferior. **Colistina Permateg** polvo se disuelve en 2 a 4 ml de agua para inyectables o solución fisiológica estéril y se vierte en el reservorio del nebulizador.

Adultos y Niños mayores de 2 años	Niños menores de 2 años
75-150 mg	50-75 mg
dividido en 2 veces por día	

Presentación: Envase conteniendo 1 frasco-ampolla y 1 ampolla disolvente.

Presentación hospitalaria: envase conteniendo 24 frascos-ampolla y 24 ampollas con disolvente.

Presentation: • Package containing 1 blister with 1 vial of colistimethate sodium and 1 ampoule of diluent. • Package containing 24 blisters with 1 vial of colistimethate sodium and 1 ampoule of diluent each one.

Dosage: IM/IV. Adults: 5 mg/kg/day divided in 2-3 or 4 times per day.

Children: 2,5 mg/kg/day divided in 2-3 or 4 times per day.

Inhalant. Adults and Children > 2 years old: 75-150 mg, divided in 2 times per day.

Children < 2 years old: 50-75 mg, divided in 2 times per day.

Bibliografía: 1. Harkov N., Apostolakis H., Komoudiou C. y otros. Intravenous Colistin in treatment. 2. Levin AS., Barne AA., Penco J. y col. Intravenous colistin as therapy for nosocomial infections caused by multidrugs / Resistant pseudomona aeruginosa and acinetobacter baumannii. Clin. Infect. Dis.1999; 28: 1008-1011. 3. BerlandLlop JM., Fort E., Badia M., Jodar R. Use of colistin in he treatment of multiple drug resistant gramnegative infections. Am J. Health sust. Pharm. 2005; 62: 39-47. 4. Garnacho J., Sole-Violan J., Borges SA., Diaz M., Rello E. Clinical impact of pneumonia caused by acinetobacter baumannii in intub patient: a matched cohort study. Crit. Care Med. 2003; 3: 2478-2482. 5. Rodriguez CH., Pautao, bombisino K., Vay C., Famiglietti A. Sensibilidad a colistin: evaluación de los puntos de corte disponibles en el antibiograma por difusión. Rev. Arg. de microbiología. 6. MarinAmenta JA. Antibioticos en cirugia. www.drmarin.galeou.com.



PERMATEG®
LABORATORIO MEDICINAL S.A.



Combate de los Pozos 336 (C1080AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,
Tel.Fax: (54.11) 4382.1454 líneas rotativas. / e-mail: info@permategsa.com.ar / www.permategsa.com.ar