

distec® gel diclofenac



**analgésico percutáneo
antiinflamatorio
articulaciones
reumatismos**

Potencia comprobada • Rapidez de acción • Uso externo

Suavemente mentolado • No graso • No mancha

Gel en pomos de 30 y 50 gr



PERMATEC®
LABORATORIO MEDICINAL S.A.

distec® gel diclofenac

Acción terapéutica: Antiinflamatorio, antirreumático y analgésico percutáneo.

Precauciones y advertencias: **Distec® gel** sólo debe aplicarse sobre la piel sana, evitando las heridas, el contacto con los ojos y con las membranas mucosas. No debe ser ingerido.

Contraindicaciones: **Distec® gel** está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al diclofenac, ácido salicílico y a otros compuestos antiinflamatorios no esteroides. Sensibilidad a cualquier otro componente de la formulación como propilenglicol y alcohol isopropílico. Contraindicado en niños menores de 6 años. No utilizar durante la lactancia.

Posología: Depende del área que deba ser tratada. Aplicar 2 a 4 gramos de gel, de 3 a 4 veces al día, sobre la parte afectada, masajeando suavemente hasta desaparecer el preparado de la piel.

Presentación: Pomos por 30 y 50 gr.

Bibliografía

1. Picassia DD, Robinson JK. Actinic cheilitis: a review of the etiology, differential diagnosis, and treatment. *J Am Acad Dermatol.* 1987; 17 (2 Pt 1): 255-64. (PUBMED abstract).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=list_uids=3305604&doct=Abstract
2. Preston DS, Stern RS. Nonmelanoma cancers of the skin. *N Engl J Med.* 1992; 327(23): 1649-62. (PUBMED abstract).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=&doct=AbstractPlus&list_uids=1435901
3. Lebwohl M, Dinehart S, Whiting D, Lee PK, Tawfik N, Jorizzo J, Lee JH, Fox TL. Imiquimod 5% cream for the treatment of actinic keratosis: results from two phase III, randomized, double-blind, parallel group, vehicle-controlled trials. *J Am Acad Dermatol.* 2004; 50(5):714-21. (PUBMED abstract).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=&doct=AbstractPlus&list_uids=15097955
4. Tran H, Chen K, Shumack S. Summary of actinic keratosis studies with imiquimod 5% cream. *Br J Dermatol.* 2003; 149 Suppl 66: 37-9. (PUBMED abstract).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=&doct=AbstractPlus&list_uids=14616347
5. Lee PK, Harwell WB, Loven KH, Phillips TJ, Whiting DA, Andres KL, Lee JH. Long-term clinical outcomes following treatment of actinic keratosis with imiquimod 5% cream. *Dermatol Surg.* 2005; 31(6): 659-64.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=&doct=AbstractPlus&list_uids=15996416
6. Grace D, Roque J, Skeith K. Topical diclofenac versus placebo: double blind, randomized clinical trial in patients with osteoarthritis of the knee. *J reumatol.* 1999; 26:2659-2663.
7. Deal ChL, Schnitzer TJ, Lipstein E, et al. treatment of arthritis with topical capsaicin: a double blind trial. *Clinical therapeutics* 1991; 13 (3): 383-395.



PERMATEC®
LABORATORIO MEDICINAL S.A.

Permatec Laboratorio Medicinal S.A. Combate de los Pozos 336 (C1080AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.Fax: (54.11) 4382.1454 líneas rotativas / e-mail: info@permatecsa.com.ar / www.permatecsa.com.ar