

## CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original y a temperatura ambiente menor de 30°C.

PROTEGER DEL CALOR.

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MEDICA.**

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 52.753.

Director Técnico: Débora De Lucca.

Elaborado en: Coronel Mendez 438/40 Wilde - Avellaneda - Pcia. de Bs. As. y/o Arenales 251- Ramos Mejía - Pcia. de Bs As.

Fecha de última actualización: marzo de 2005

## PERMATEC LABORATORIO MEDICINAL S.A.

Combate de los Pozos 336 - Ciudad Aut. de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4382-1454. Líneas rotativas.



**PERMATEC**  
LABORATORIO MEDICINAL S.A.

50137

# DISTEC® GEL DICLOFENAC DIETILAMINA

## Gel de uso externo

Industria Argentina

Venta bajo receta

### FORMULA:

Cada 100 g contiene:

Diclofenac dietilamina (equivalente a 1 g de diclofenac sódico) .....	1,16 g
Dietilamina .....	0,90 g
Carbopol 940 .....	16,0 g
Alcohol isopropílico .....	20,0 g
Mentol .....	0,50 g
Propilenglicol .....	5,00 g
Metilparabeno .....	0,18 g
Propilparabeno .....	0,02 g
Agua purificada c.s.p. ....	100,00 g

### ACCION TERAPEUTICA:

Antiinflamatorio, antirreumático, analgésico percutáneo.

### INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Formas inflamatorias de las enfermedades reumáticas. Dolor e inflamación postraumático y postoperatorio. Dolor e inflamación postraumática de tendones, ligamentos y articulaciones debido a golpes, distensión y torceduras. Formas localizadas de enfermedades reumáticas de partes blandas, por ej. tendinitis, bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatías.



Formas localizadas de enfermedades reumáticas degenerativas, por ej. artrosis de articulaciones periféricas y de columna vertebral.

**DOSIFICACION Y MODO DE ADMINISTRACION:**

Aplicar una capa de gel localmente sobre la piel 3 a 4 veces al día y frotar suavemente.

**CONTRAINDICACIONES:**

DISTEC® GEL esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al diclofenac, ácido salicílico y a otros compuestos antiinflamatorios no esteroides. Sensibilidad a cualquier otro componente de la formulación como propilenglicol y alcohol isopropílico.

Contraindicado en niños menores de 6 años. No utilizar durante la lactancia.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

No aplicar sobre heridas abiertas. Evitar el contacto con los ojos o con las membranas mucosas. No debe ser tomado por boca. Los efectos adversos sistémicos no pueden ser excluidos cuando se aplica sobre grandes áreas de piel o cuando se usa durante períodos prolongados.

**Embarazo:** no se conoce el resultado de su acción en mujeres embarazadas, por lo que no se recomienda su utilización durante el periodo de gestación.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Dermatitis por contacto alérgica o no. En casos aislados: Rash cutáneo generalizado, reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilidad.

**SOBREDOSIFICACION:**

En casos de efectos sistémicos significativos

como consecuencia de una utilización inadecuada o sobredosis significativa accidental (por ejemplo en niños), deben adoptarse las medidas terapéuticas generales utilizadas para el tratamiento de intoxicaciones con drogas antiinflamatoria no esteroides.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666/4962-2247

- Hospital A. Posadas:

(011) 4658-7777/4654-6648.

**OTRA INFORMACION IMPORTANTE:**

Este medicamento se le ha prescripto solo para el tratamiento de su afección actual. No se lo de a otras personas, ni lo utilice para otros problemas de salud sin que se lo haya indicado su medico.

Asegúrese de tomar este medicamento de manera regular y siguiendo exactamente las indicaciones de su médico. Esto le ayudará a obtener los mejores resultados y a reducir el riesgo de efectos secundarios. El tratamiento de su problema médico puede durar unos cuantos días, varias semanas o incluso mas tiempo. Si tiene dudas acerca de su tratamiento, consulte a su médico.

No utilice DISTEC® GEL después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

**PRESENTACION:**

Envases conteniendo: 1 Pomo conteniendo 10g, 30g y 50g de Gel 1%.

